

## SWITCH O CAMBIO DE tOPV a bOPV

La retirada de OPV sera secuencial iniciando con el poliovirus tipo 2 a través el switch de tOPV a bOPV




**OPV**

**tOPV**



**IPV**



**OPV**

**bOPV**



# SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

## 29 DE ABRIL DEL 2016



### ANTES

#### ORGANICE

- Vacune solo con Sabin trivalente (tOPV) y ajuste al mínimo su stock.
- Mantenga en cadena de frío las tres vacunas:
  - tOPV
  - IPV
  - bOPV
- Identifique claramente cada una de las vacunas.

### 29 DE ABRIL DEL 2016

#### RETIRE

#### AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL

- Retire de la cadena de frío todos los frascos de la vacuna Sabin Trivalente (tOPV)
- Coloque la tOPV en un descartador exclusivo para tal fin.
- Identifique con la leyenda "Fuera de la cadena de frío - NO USAR - para disposición final" y separe el resto de los residuos.

### DESPUÉS

#### VERIFIQUE

- No debe quedar tOPV en la heladera bajo ninguna circunstancia.
- La jornada siguiente, vacune contra la polio con el esquema secuencial IPV-bOPV



Ministerio de Salud  
Presidencia de la Nación

# SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

## NUEVO ESQUEMA SECUENCIAL DE VACUNACIÓN ANTIPOLIOMIELÍTICA:

EDAD	VACUNA
Lactantes de 2 meses*	1º dosis con vacuna IPV
Lactantes de 4 meses*	2º dosis con vacuna IPV
Lactantes de 6 meses	3ª dosis con Vacuna bOPV
Niños y niñas de 15-18 meses	1er refuerzo con vacuna bOPV
Niños y Niñas de 5-6 años	2do refuerzo con vacuna bOPV

\*Se utilizará vacuna IPV únicamente en niños que inicien esquema hasta los 11 meses y 29 días de edad. Aquellos lactantes que hubieran comenzado su esquema de vacunación con vacuna tOPV, deberán completar su esquema con vacuna oral (bOPV).

